



# **Nepovinná očkování - hrazená zdravotní pojišťovnou (ZP)**

Aktuální 07/2023

Věk dítěte (kdy je vakcína plně/částečně hrazena ZP)	Nemoci	Vakcína
2 - 3 měsíce  (od započatého 9. týdne)	Pneumokok	Synflorix Prevenar 13 Vaxneuvance
	Meningokok typ B	Bexsero
4 měsíce (cca 2 měsíce po 1. dávce)		2. dávka (obou výše zmíněných)
11 - 13 měsíců (cca 6 měsíců po 2. dávce)		3. dávka (obou výše zmíněných)
mezi 1. a 2. narozeninami	Meningokok A,C,W,Y	Nimenrix Menquadfi
mezi 13. a 14. narozeninami	Onemocnění lidským Papilomavirem	Cervarix Gardasil 9
mezi 14. a 15. narozeninami	Meningokok typ B	Bexsero Trumenba
mezi 14. a 15. narozeninami	Meningokok A,C,W,Y	Nimenrix Menveo Menquadfi

# MENINGOKOK B

**Bexsero** –  
od 2 měsíců

**Trumenba** -  
od 10 let

## O co jde?

- neživá vakcína
- proti nemocem způsobených meningokokem typ B
- 3 dávky
- očkování do svalu (na stehně kojenci, starší na paži)
- očkovat lze kdykoli, hrazena ZP je při zahájení očkování do 1 roku/během 15. roku života

## Nežádoucí účinky:

*(objeví se během hodin)*

- lokální – otok, bolest, zarudnutí
- celkové – horečka, únava, bolest hlavy, nevolnost, bolest svalů a kloubů



# MENINGOKOK A,C,W,Y

**Nimenrix**  
od 1 roku

**Menquadfi**  
od 1 roku

**Menveo**  
od 2 let

## O co jde?

- neživá vakcína
- proti nemocem způsobených meningokokem typ A,C,W135,Y
- 1 dávka
- očkování do svalu (na stehně kojenci, starší na paži)
- očkovat lze kdykoli, hrazena ZP je při očkování ve 2. roce/15. roce života

## Nežádoucí účinky:

*(objeví se během hodin)*

- lokální – otok, bolest, zarudnutí
- celkové – horečka, únava, podráždění

# PNEUMOKOK

## Synflorix

10 sérotypů\*

## Prevenar 13

13 sérotypů

## Vaxneuvance

15 sérotypů

### O co jde?

- neživá vakcína
- proti nemocem způsobených pneumokokem
- 3 dávky
- očkování do svalu (na stehně kojenci, starší na paži)
- očkovat lze kdykoli, hrazena ZP je ve výši nejlevnější (Synflorix), doplatek hradí pacient

### Nežádoucí účinky:

*(objeví se během hodin)*

- lokální – bolest, zarudnutí, otok
- celkové – horečka, nechutenství, spavost/nespavost

\*Jednotlivé typy pneumokoka se nazývají sérotypy.  
Máme jich přes 90, ale očkujeme proti 10/13/15 sérotypům.



# PAPILOMAVIRUS

## Cervarix

2 typy

## Gardasil 9

9 typů

### O co jde?

- neživá vakcína
- proti nemocem způsobených papilomavirem
- 9 - 14 let – 2 dávky
- 15 let a více – 3 dávky
- hrazeno ZP je při podání první dávky ve 13 letech
- očkování do svalu na horní části paže

### Nežádoucí účinky:

*(objeví se během hodin)*

- lokální – bolest, zarudnutí
- celkové – únava, bolest hlavy

**Pro více informací  
si poslechněte  
naše podcasty!**

**50. díl - Očkování V.  
Pneumokok  
a meningokok**

**+**

**14. díl - Očkování I.  
17. díl - Očkování II.**

**Prohlédněte si  
příspěvek věnovaný  
povinným očkováním,  
kde naleznete i naše  
tipy pro úspěšné  
očkování!**